

Abatacept (Orencia®)

Werking van abatacept

Abatacept is een eiwit dat de activiteit van T-lymfocyten onderdrukt. Deze T-lymfocyten behoren tot het afweersysteem. Het zijn specifieke witte bloedcellen die een rol spelen bij het ontstaan van ontstekingen en gewrichtsschade bij reumatoïde artritis.

Wanneer wordt abatacept voorgeschreven?

Abatacept wordt (meestal in combinatie met methotrexaat) gebruikt voor de behandeling van actieve reumatoïde artritis. Abatacept kan voorgeschreven worden aan patiënten die onvoldoende reageren op andere geneesmiddelen. Abatacept kan alleen voorgeschreven worden aan patiënten die tenminste één TNF-remmer (biological), genomen hebben.

Het gebruik van abatacept

- Abatacept wordt toegediend in het ziekenhuis d.m.v een infuus.
- Dit infuus duurt ongeveer 30 minuten. De dosering is afhankelijk van het lichaamsgewicht. In de eerste maand wordt het middel om de twee weken toegediend (vier doses), daarna om de vier weken.
- Abatacept werkt langzaam. Het kan maanden duren vooraleer u effect merkt.

Controle

- Tijdens het infuus worden uw bloeddruk, hartslag en temperatuur gecontroleerd.
- Meestal wordt er bloed afgenomen voor controle.
- U kunt de uitslagen van het bloedonderzoek opvragen bij uw arts.

Bijwerkingen van abatacept

- Ongewenste reacties of bijwerkingen gebeuren meestal tijdens het infuus.
- Mogelijke bijwerkingen/reacties zijn: hoofdpijn, misselijkheid, huiduitslag, jeuk, ademhalingsmoeilijkheden en bloeddrukverhoging of –verlaging. Tijdens het infuus houdt een arts of verpleegkundige u nauwlettend in de gaten.
- Mochten er zich ongewenste reacties of bijwerkingen voordoen, dan kan de toediening van abatacept vertraagd of onderbroken worden. Als het nodig zou blijken, krijgt u een anti allergiemiddel.
- Mensen die met abatacept behandeld worden, hebben een iets grotere kans op infecties. Meet uw koorts wanneer u zich ziek voelt. Neem bij koorts of andere tekenen van ontsteking, bijvoorbeeld een etterend wondje, altijd contact op met uw reumatoloog.

Zwangerschap en borstvoeding

Over het gebruik van abatacept tijdens zwangerschap zijn onvoldoende gegevens bekend. Overweegt u een zwangerschap of wilt u borstvoeding geven, overleg dan eerst met uw reumatoloog.

Vaccinaties

- U kunt probleemloos een griepvaccinatie krijgen wanneer u behandeld wordt met abatacept.
- We raden u aan om andere vaccinaties eerst met uw huisarts of reumatoloog te overleggen.

Operaties en andere ingrepen

Theoretisch gezien kan abatacept een verhoogd risico op postoperatieve infecties en een vertraagde wondgenezing met zich meebrengen. Daarom raden wij u aan om eventuele operaties uit te stellen tot drie maanden na de laatste toediening van abatacept. De volgende abatacept toediening kan pas beginnen nadat de wond genezen is.

Gebruik van abatacept samen met andere medicijnen

- Licht uw arts in over uw behandeling met abatacept.
- Het gelijktijdig gebruik van verschillende medicijnen is niet altijd veilig.

Vertel uw huisarts, uw tandarts en uw specialist daarom altijd welke medicijnen u gebruikt. Denk ook aan voedingssupplementen en geneesmiddelen die zonder voorschrift verkrijgbaar zijn.

Aandachtspunt voor patiënten met suikerziekte

Sommige bloedglucosemeetsystemen kunnen reageren met de in abatacept aanwezige maltose. Dat kan leiden tot foute metingen van de bloedglucose op de dag van uw infusie. U kunt uw insulinedosering hier dus niet op baseren.

Meer informatie

Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen of opmerkingen, neem dan contact op met uw huisarts of uw reumatoloog.

Onafhankelijke informatie over geneesmiddelen kunt u vinden op de website van het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie www.bcfi.be .