

Baricitinib (Olumiant®)

Werking en toepassing

Baricitinib behoort tot de groep van de zogenaamde Januskinase reumaremmers (JAK kinase inhibitoren/remmers). Het wordt voorgeschreven aan mensen met een reumatische aandoening zoals reumatoïde artritis. Het kan de zwelling en pijn in uw gewrichten verminderen waardoor de gewrichten minder schade oplopen. Baricitinib is geen pijnstiller. De werking van Baricitinib begint u pas te merken na 12 weken gebruik.

Het gebruik van Tofacitinib

Voorafgaand aan de behandeling met Baricitinib dient onderzocht te worden of u in aanmerking komt voor de behandeling en of de behandeling voor u veilig is. Dit houdt o.a. in dat u gescreend wordt op een doorgemaakte TBC infectie in het verleden.

Baricitinib is beschikbaar als tablet van 4 mg en 2 mg . De gebruikelijke dosering bedraagt 1 keer 4 mg per dag. Bij nierproblemen wordt dat 1 keer 2mg per dag. Zorg voor regelmaat en neem het middel op hetzelfde tijdstip.

- Neem het middel tijdens of net na een maaltijd, u loopt minder kans op misselijkheid.
- Slik de tablet als geheel door. Kauw er niet op en maak ze niet fijn.

Bijwerkingen

In de bijsluiter staan alle bekende bijwerkingen. De meest voorkomende bijwerkingen zijn:

- Maag- en darmklachten zoals misselijkheid (meestal mild), soms braken of diarree welke vaak na enkele weken verdwijnen
- Hoofdpijn en soms duizeligheid
- Opflakkeren van zona of gordelroos klachten (=herpes zoster infectie met pijnlijke blaasjes)
- Stijgen van vetten / triglyceridenwaarden in bloed tijdens behandeling met Baricitinib
- Irritatie van de lever (stijging van leverenzymen in het bloed)
- Bloedarmoede, onverwachte bloedingen of blauwe plekken (tekenen van stoornis in de bloedaanmaak)

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

- Baricitinib heeft waarschijnlijk geen invloed op de vruchtbaarheid.
- Baricitinib mag **niet** gebruikt worden tijdens de zwangerschap.
- Mannen en vrouwen moeten **ruim voor** een beoogde zwangerschap **stoppen** met het gebruik van Baricitinib.
- Baricitinib gaat over in de borstvoeding, dus tijdens de behandeling mag **geen** borstvoeding gegeven worden.

- Overweegt u een zwangerschap of wilt u borstvoeding geven, overleg dan eerst met uw reumatoloog.

Veiligheid

Dosering

Gebruik de voorgeschreven dosering. Stop niet zomaar met het gebruik van Baricitinib. Overleg met uw reumatoloog als u wilt stoppen met de behandeling. Verhoog de dosis nooit zonder overleg met uw reumatoloog.

Bloedonderzoek

Tijdens de behandeling met Baricitinib wordt uw bloed regelmatig afgenomen voor controle.

Alcohol

Overleg het gebruik van alcohol met uw reumatoloog.

Vaccinaties

De griepvaccinatie (griep prik) is mogelijk. We adviseren om overige vaccinaties met uw huisarts of reumatoloog te overleggen.

Gebruik van Tofacitinib samen met andere medicijnen

- Het gelijktijdig gebruik van verschillende medicijnen is niet altijd veilig.
- Vertel uw huisarts, uw tandarts en uw specialist altijd welke medicijnen u gebruikt; Denk ook aan voedingssupplementen en geneesmiddelen die zonder voorschrift verkrijgbaar zijn. Enkele geneesmiddelen kunnen niet samen met apremilast gebruikt worden, omdat ze de bijwerkingen kunnen versterken.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen of opmerkingen, neem dan contact op met uw huisarts of uw reumatoloog.

Onafhankelijke informatie over geneesmiddelen kunt u vinden op de website van het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische informatie www.bcfi.be .