

## **Certolizumab pegol (Cimzia®)**

### **Werking van certolizumab pegol**

Certolizumab pegol blokkeert het eiwit TNF. TNF speelt een belangrijke rol bij ontstekingen. Bij een aantal reumatische aandoeningen is er sprake van een teveel aan TNF. Certolizumab pegol remt de werking van TNF-alfa waardoor ontstekingsklachten afnemen. Hierdoor kan certolizumab pegol de pijn en zwelling in uw gewrichten verminderen waardoor ze op lange termijn minder schade oplopen.

### **Wanneer wordt certolizumab pegol voorgeschreven?**

Certolizumab pegol kan voorgeschreven worden aan mensen met reumatoïde artritis die onvoldoende reageren op andere geneesmiddelen.

We gaan eerst nu of u in aanmerking komt voor de behandeling en of adalimumab veilig is voor us. U wordt onder meer gescreend op een eerdere tuberculose (TBC-) infectie

### **Het gebruik van certolizumab pegol**

- Certolizumab pegol wordt toegediend met onderhuidse injecties. Een verpleegkundige leert hoe u zich zelf injecties kunt geven.
- Het injecteren moet eenmaal per twee weken gebeuren. De eerste drie keer dient u een oplaaddosis van 400 mg (twee injecties) toe. Daarna volstaat de een injectie (200 mg) per twee weken.
- Certolizumab pegol werkt snel, soms al na twee weken. Het maximale effect laat iets langer op zich wachten.
- Certolizumab pegol wordt vaak gecombineerd met methotrexaat (MTX, zie de betreffende informatiefolder).

### **Controle**

- Tijdens de behandeling met adalimumab zal uw bloed regelmatig worden afgenomen. Bij deze controle worden rode en witte bloedlichaampjes, bloedplaatjes, leverfuncties en uw nierfunctie beoordeeld.

### **Bijwerkingen van certolizumab pegol**

De volgende opsomming is niet volledig maar geeft een overzicht van de meest voorkomende bijwerkingen.

- Op de plaats waar u zichzelf injecteert, kan een lichte roodheid of een kleine blauwe plek ontstaan. Wij adviseren u om de injectieplaats af te wisselen. Als u zich afvraagt of u de juiste injectietechniek toepast, neem dan contact op met uw arts
- Mensen die certolizumab pegol gebruiken, hebben een grotere kans op infecties. Neem daarom altijd de temperatuur op wanneer u zich ziek voelt.

Neem bij koorts of andere tekenen van infectie, bijvoorbeeld een etterend wondje, altijd contact op met uw reumatoloog en wacht met het toedienen van de injectie.

### **Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding**

Over het gebruik van certolizumab pegol tijdens zwangerschap zijn onvoldoende gegevens bekend. Overweegt u een zwangerschap of wilt u borstvoeding geven, overleg dan eerst met uw reumatoloog.

### **Vaccinaties**

- De griepvaccinatie (griep prik) is mogelijk.
- We adviseren om overige vaccinaties eerst met uw huisarts of reumatoloog te overleggen.

### **Operaties en andere ingrepen**

Theoretisch gezien kan certolizumab een verhoogd risico op postoperatieve infecties en een vertraagde wondgenezing met zich meebrengen. Daarom raden wij u aan om eventuele operaties uit te stellen. Bij een geplande operatie raden wij u aan om 4 weken vooraf te stoppen met certolizumab pegol. Wanneer de wonde genezen is, kunt u de behandeling opnieuw starten.

### **Gebruik van certolizumab pegol samen met andere medicijnen**

- Vertel uw huisarts, uw tandarts en uw specialist altijd welke medicijnen u gebruikt. Denk ook aan voedingssupplementen en geneesmiddelen die zonder voorschrift verkrijgbaar zijn.
- Het gelijktijdig gebruik van verschillende geneesmiddelen is niet altijd veilig.

### **Aandachtspunt m.b.t. bloedstollingstesten**

Certolizumab pegol kan het resultaat van bepaalde bloedstollingstesten beïnvloeden. Vertel uw arts over uw behandeling met certolizumab pegol als u een bloedstollingsonderzoek moet ondergaan.

### **Meer informatie**

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen of opmerkingen, neem dan contact op met uw huisarts of uw reumatoloog.

Onafhankelijke informatie over geneesmiddelen kunt u vinden op de website van het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische informatie [www.bcfi.be](http://www.bcfi.be).