

Denosumab (Prolia[®])

Werking van denosumab

Denosumab blokkeert de werking van het eiwit RANK-L (RANK Ligand). RANK-L speelt een belangrijke rol bij botafbraak. Bij osteoporose is er sprake van een teveel aan botafbraak TNF. Denosumab blokkeert RANKL waardoor de botafbraak afremt en de botaanmaak verder gaat. Denosumab kan het risico op heup- en wervelfracturen verminderen.

Wanneer wordt denosumab voorgeschreven?

Denosumab kan voorgeschreven worden aan patiënten met osteoporose bij wie andere geneesmiddelen onvoldoende effect hadden.

Het gebruik van denosumab

- Het gebruik van denosumab gebeurt door middel van onderhuidse injecties. U leert om uzelf te injecteren. Dat moet één keer per zes maanden gebeuren.
- Denosumab wordt altijd gecombineerd met calcium en vitamine D behandeling.

Controle

Tijdens de behandeling met denosumab zal uw bloed regelmatig worden afgenomen. Bij deze controle worden rode en witte bloedlichaampjes, bloedplaatjes, leverfuncties, nierfunctie, vitamine D en calcium beoordeeld. U kunt de uitslagen van het bloedonderzoek opvragen bij uw arts.

Bijwerkingen van denosumab

De volgende opsomming is niet volledig maar geeft een overzicht van de meest voorkomende bijwerkingen.

- Op de plaats waar u zichzelf injecteert, kan een lichte roodheid of een kleine blauwe plek ontstaan. Als u zich afvraagt of u de juiste injectietechniek toepast, neem dan contact op met uw arts.
- Mensen die denosumab gebruiken, hebben een iets grotere kans op infecties. Meet daarom altijd uw koorts wanneer u zich ziek voelt. Neem bij koorts of andere tekenen van ontsteking, zoals een etterend wondje, altijd contact op met uw reumatoloog of huisarts en wacht met het toedienen van de injectie.
- Wanneer u een tandartsbezoek plant met eventuele tandextracties is het aangeraden om de injectie met denosumab uit te stellen.

Vaccinaties

U kunt probleemloos een vaccinatie krijgen wanneer u behandeld wordt met denosumab.

Gebruik van denosumab samen met andere medicijnen

- Vertel uw huisarts, uw tandarts en uw specialist altijd welke medicijnen u gebruikt. Denk ook aan voedingssupplementen en geneesmiddelen die zonder voorschrift verkrijgbaar zijn.
- Het gelijktijdig gebruik van verschillende geneesmiddelen is niet altijd veilig. Denosumab mag NIET gebruikt worden samen met de biologicals (anti-reumatica zoals Anakinra, Cimzia, Enbrel, Humira, Infliximab, Orencia, Roactemra, Simponi).

Meer informatie

Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen of opmerkingen, neem dan contact op met uw huisarts of uw reumatoloog. Onafhankelijke informatie over geneesmiddelen kunt u vinden op de website van het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie www.bcfi.be .