

Etanercept (Enbrel®)

Werking van etanercept

Etanercept blokkeert de activiteit van TNF. TNF-alfa speelt een belangrijke rol bij ontstekingen. Bij een aantal reumatische aandoeningen is er sprake van een teveel aan TNF. Etanercept vermindert de werking van TNF waardoor ontstekingsklachten afnemen. Etanercept kan de pijn en de zwelling in uw gewrichten doen afnemen waardoor uw gewrichten op lange termijn minder schade oplopen.

Wanneer wordt etanercept voorgeschreven?

Etanercept kan voorgeschreven worden aan mensen met een reumatische ziekte (zoals reumatoïde artritis, artritis psoriatica en de ziekte van Bechterew) die onvoldoende reageren op andere geneesmiddelen.

Voorafgaand aan de behandeling met etanercept dient onderzocht te worden of u in aanmerking komt voor de behandeling en of de behandeling voor u veilig is. Dit houdt o.a. in dat u gescreend wordt op een doorgemaakte TBC infectie in het verleden.

We gaan eerst nu of u in aanmerking komt voor de behandeling en of de behandeling met etanercept veilig is voor u. U wordt onder meer gescreend op een tuberculose (TBC-) infectie in het verleden.

Het gebruik van etanercept

- Het gebruik van etanercept gebeurt door onderhuidse injecties. U leert zichzelf injecteren (met een zogenaamde prikpen). Meestal moet dat eens per week, soms twee keer per week gebeuren.
- Etanercept werkt snel, soms al binnen 48 uur. Het duurt wel enkele weken voordat er voldoende resultaat is.
- Wanneer u goed op het middel reageert, kunnen de periodes tussen de injecties verlengd worden.
- Etanercept wordt vaak gecombineerd met methotrexaat (MTX, zie de betreffende informatiefolder).

Controle

- Tijdens de behandeling met etanercept zal uw bloed regelmatig worden afgenomen. Bij deze controle worden rode en witte bloedlichaampjes, bloedplaatjes, leverfuncties en uw nierfunctie beoordeeld.

Bijwerkingen van etanercept

De volgende opsomming is niet volledig maar bevat de meest voorkomende bijwerkingen.

- Op de plaats waar u zichzelf injecteert, kan een lichte roodheid of een kleine blauwe plek ontstaan. Wij adviseren u om de injectieplaats af te wisselen. Als u zich afvraagt of u de juiste injectietechniek toepast, neem dan contact op met uw arts of de thuisverpleegkundige.
- Mensen die etanercept gebruiken, hebben een grotere kans op infecties. Neem daarom altijd de temperatuur op wanneer u zich ziek voelt. Neem bij koorts of andere tekenen van infectie, bijvoorbeeld een etterend wondje, altijd contact op met uw reumatoloog en wacht met het toedienen van de injectie.

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

- Over het gebruik van etanercept tijdens zwangerschap zijn onvoldoende gegevens bekend.
- Overweegt u een zwangerschap of wilt u borstvoeding geven, overleg dan eerst met uw reumatoloog.

Vaccinaties

- De griepvaccinatie (griep prik) is mogelijk.
- We adviseren om overige vaccinaties eerst met uw huisarts of reumatoloog te overleggen.

Operaties en andere ingrepen

Theoretisch gezien kan etanercept een verhoogd risico op postoperatieve infecties en een vertraagde wondgenezing met zich meebrengen. Daarom raden wij u aan om eventuele operaties uit te stellen. Bij een geplande operatie raden wij u aan om twee weken vooraf te stoppen met het gebruik van etanercept. Wanneer de wonde genezen is, kunt u de behandeling opnieuw starten.

Gebruik van etanercept samen met andere medicijnen

- Vertel uw huisarts, uw tandarts en uw specialist altijd welke medicijnen u gebruikt. Denk ook aan voedingssupplementen en geneesmiddelen die zonder voorschrift verkrijgbaar zijn het gelijktijdig gebruik van verschillende medicijnen is niet altijd veilig.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen of opmerkingen, neem dan contact op met uw huisarts of uw reumatoloog.

Onafhankelijke informatie over geneesmiddelen kunt u vinden op de website van het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische informatie www.bcfi.be .