

Golimumab (Simponi®)

Werking van golimumab

Golimumab is een antilichaam dat het eiwit TNF blokkeert. TNF speelt een belangrijke rol bij ontstekingen. Bij een aantal reumatische aandoeningen is er sprake van een teveel aan TNF. Golimumab blokkeert TNF waardoor ontstekingsklachten verminderen.

Golimumab kan de pijn en de zwelling in uw gewrichten doen afnemen waardoor uw gewrichten minder schade oplopen.

Wanneer wordt golimumab voorgeschreven?

Golimumab kan voorgeschreven worden aan mensen met een reumatische aandoening (zoals reumatoïde artritis, artritis psoriatica en de ziekte van Bechterew) die onvoldoende reageren op andere geneesmiddelen.

Voorafgaand aan de behandeling met golimumab dient onderzocht te worden of u in aanmerking komt voor de behandeling en of de behandeling voor u veilig is. Dit houdt o.a. in dat u gescreend wordt op een doorgemaakte TBC infectie in het verleden.

We gaan eerst nu of u in aanmerking komt voor de behandeling en of de behandeling met Golimumab veilig is voor u. U wordt onder meer gescreend op een tuberculose (TBC-) infectie in het verleden.

Het gebruik van golimumab

- Het gebruik van golimumab gebeurt door onderhuidse injecties. U leert zichzelf injecteren (met een zogenaamde prikpen). Dat moet één keer per maand gebeuren.
- Golimumab wordt vaak gecombineerd met methotrexaat (MTX, zie de betreffende informatiefolder).
- Uw arts beoordeelt het effect van de behandeling met golimumab na ongeveer 3 maanden.

Controle

Tijdens de behandeling met golimumab zal uw bloed regelmatig worden afgenomen. Bij deze controle worden rode en witte bloedlichaampjes, bloedplaatjes, leverfuncties en uw nierfunctie beoordeeld. U kunt de uitslagen van het bloedonderzoek opvragen bij uw arts.

Bijwerkingen van golimumab

De volgende opsomming is niet volledig maar omvat de meest voorkomende bijwerkingen.

- Op de plaats waar u zichzelf injecteert, kan een lichte roodheid of een kleine blauwe plek ontstaan. Als u zich afvraagt of u de juiste injectietechniek toepast, neem dan contact op met uw arts of de thuisverpleegkundig
- Mensen die golimumab gebruiken, hebben een grotere kans op infecties. Neem daarom altijd de temperatuur op wanneer u zich ziek voelt. Neem bij koorts of andere tekenen van infectie, bijvoorbeeld een etterend wondje, altijd contact op met uw reumatoloog.

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Over het gebruik van golimumab tijdens zwangerschap zijn onvoldoende gegevens bekend. Overweegt u een zwangerschap of wilt u borstvoeding geven, overleg dan eerst met uw reumatoloog.

Vaccinaties

- De griepvaccinatie (grieprik) is mogelijk.
- We adviseren om overige vaccinaties eerst met uw huisarts of reumatoloog te overleggen.

Operaties en andere ingrepen

Op theoretische gronden bestaat er bij het gebruik van golimumab een verhoogd risico op postoperatieve infecties en een vertraagde wondgenezing. Daarom wordt over het algemeen geadviseerd golimumab tijdelijk te stoppen als u geopereerd moet worden. Het algemeen advies is om twee weken voor een geplande operatie (of andere ingreep) te stoppen met het gebruik van golimumab en weer te starten als de wond genezen is.

Theoretisch gezien kan golimumab een verhoogd risico op postoperatieve infecties en een vertraagde wondgenezing met zich meebrengen. Daarom raden wij u aan om eventuele operaties uit te stellen. Bij een geplande operatie raden wij u aan om twee tot zes weken vooraf te stoppen met het gebruik van golimumab. Wanneer de wonde genezen is, kunt u de behandeling opnieuw starten.

Gebruik van golimumab samen met andere medicijnen

- Vertel uw huisarts, uw tandarts en uw specialist altijd welke medicijnen u gebruikt. Denk ook aan voedingssupplementen en geneesmiddelen die zonder voorschrift verkrijgbaar zijn het gelijktijdig gebruik van verschillende geneesmiddelen is niet altijd veilig.

Extra aandachtspunten

Latexallergie

De naaldbeschermer van de prikpen bevat latex. Als u een latexallergie heeft, dient u met uw arts te overleggen voordat u golimumab gaat gebruiken.

Sorbitolintolerantie

Golimumab bevat sorbitol. Wanneer u sorbitol niet kunt verdragen, moet u uw arts spreken voordat u golimumab gaat gebruiken.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen of opmerkingen, neem dan contact op met uw huisarts of uw reumatoloog.

Onafhankelijke informatie over geneesmiddelen kunt u vinden op de website van het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische informatie www.bcfi.be .