

Infliximab (Remicade[®])

Werking van infliximab

Infliximab blokkeert het eiwit TNF. TNF speelt een belangrijke rol bij . ontstekingen. Bij een aantal reumatische aandoeningen is er sprake van een teveel aan TNF. Infliximab blokkeert TNF waardoor ontstekingsklachten afnemen.

Infliximab kan de pijn en zwelling in uw gewrichten verminderen waardoor uw gewrichten . minder schade oplopen.

Wanneer wordt infliximab voorgeschreven?

Infliximab kan voorgeschreven worden aan mensen met een reumatische aandoening (zoals reumatoïde artritis, artritis psoriatica of de ziekte van Bechterew) bij wie andere geneesmiddelen onvoldoende zijn aangeslagen.

Alternatief: We gaan eerst na of u in aanmerking komt voor de behandeling en of de behandeling met Infliximab veilig is voor u. U wordt onder meer gescreend op een tuberculose (TBC-) infectie in het verleden.

Het gebruik van infliximab

- De behandeling met infliximab gebeurt in het ziekenhuis.
- Infliximab wordt toegediend via een infuus. Dit duurt ongeveer twee uur.
- Na het eerste infuus volgt er één na twee weken, dan na zes weken en vervolgens elke acht weken.
- De dosering infliximab is hangt af van uw lichaamsgewicht en van de ernst van de ontstekingen.
- Infliximab kan snel werken, soms al na 48 uur. Vaak zijn er maar enkele weken nodig om resultaat te bereiken.
- Wanneer u goed op het middel reageert, wordt de dosering soms verlaagd.
- De behandeling met infliximab wordt meestal gecombineerd met methotrexaat (MTX, zie de betreffende informatiefolder).

Controle

- Bij ieder infuus zal bloed worden afgenomen voor controle.
- Bij deze controle worden de rode en witte bloedlichaampjes, bloedplaatjes, leverfuncties en nierfunctie beoordeeld.

Bijwerkingen van infliximab

- Tijdens het toedienen van infliximab kan uw bloeddruk schommelen. De verpleegkundige zal daarom regelmatig uw bloeddruk meten. Ook lichtheid in het hoofd en een warm gevoel zijn mogelijk. Deze klachten nemen meestal snel af na het infuus.
- Het gebruik van infliximab kan leiden tot huiduitslag. Meestal gebeurt dat na meerdere behandelingen. De huiduitslag kan tijdens de behandeling optreden, maar ook als u weer thuis bent. Meld deze reactie altijd aan uw reumatoloog.
- Soms kunnen de allergische reacties behandeld worden met anti-allergiemiddelen. Soms is het nodig de behandeling te stoppen.
- Patiënten die infliximab gebruiken, hebben een grotere kans op infecties. Neem altijd uw temperatuur op wanneer u zich ziek voelt.
- Neem bij koorts of andere tekenen van infectie, bijvoorbeeld een etterend wondje, altijd contact op met uw reumatoloog.

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Overweegt u een zwangerschap of wilt u borstvoeding geven, overleg dan eerst met uw reumatoloog.

Vaccinaties

- De griepvaccinatie (griep prik) is mogelijk.
- We adviseren om overige vaccinaties eerst met uw huisarts of reumatoloog te overleggen.

Operaties en andere ingrepen

Op theoretische gronden bestaat er bij het gebruik van infliximab een verhoogd risico op postoperatieve infecties en een vertraagde wondgenezing. Daarom wordt over het algemeen geadviseerd om niet eerder dan een maand na de laatste infliximab toediening een (geplande) operatie (of andere ingreep) te ondergaan. Met de volgende infliximab toediening dient gewacht te worden totdat de wond genezen is.

Theoretisch gezien kan infliximab een verhoogd risico op postoperatieve infecties en een vertraagde wondgenezing met zich meebrengen. Daarom raden wij u aan om eventuele operaties uit te stellen. Bij een geplande operatie raden wij u aan om een maand vooraf te stoppen met het gebruik van infliximab. Wanneer de wonde genezen is, kunt u de behandeling opnieuw starten.

Gebruik van medicatie tijdens behandeling met infliximab

Vertel uw huisarts, uw tandarts en uw specialist altijd welke medicijnen u gebruikt. Denk ook aan voedingssupplementen en geneesmiddelen die zonder voorschrift verkrijgbaar zijn het gelijktijdig gebruik van verschillende medicijnen is niet altijd veilig.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen of opmerkingen, neem dan contact op met uw huisarts of uw reumatoloog.

Onafhankelijke informatie over geneesmiddelen kunt u vinden op de website van het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische informatie www.bcfi.be .