

Rituximab (MabThera®)

Werking van rituximab

Rituximab is een geneesmiddel dat bepaalde witte bloedcellen (de B-lymfocyten) tijdelijk uitschakelt. Deze B-lymfocyten maken deel uit van het afweersysteem. Het zijn verdedigers tegen ongewenste infecties. Ze spelen een rol bij verschillende auto-immuunziekten zoals reumatoïde artritis en SLE. Bij deze ziekten kunnen de B-lymfocyten overdreven actief zijn. Vermindering van het aantal B-lymfocyten kan de ziekte tot rust brengen.

Wanneer wordt rituximab voorgeschreven?

Rituximab wordt (meestal in combinatie met methotrexaat) gebruikt voor de behandeling van actieve reumatoïde artritis.

Rituximab kan voorgeschreven worden aan patiënten bij wie andere geneesmiddelen onvoldoende werken.

Het gebruik van rituximab

- Het toedienen van rituximab vindt plaats in het ziekenhuis en gebeurt met een infuus.
- Het eerste infuus neemt gemiddeld 4 tot 5 uur in beslag. Als u tijdens het eerste infuus geen last van bijwerkingen hebt gehad, wordt het tweede infuus meestal sneller toegediend. Het tweede infuus duurt 2,5 tot 3 uur.
- De eerste behandeling met rituximab bestaat uit twee infusen, gegeven met een interval van 2 weken. Afhankelijk van de ziekteactiviteit wordt na 6 tot 12 maanden opnieuw een infuus toegediend.
- Rituximab werkt langzaam in. Daarom duurt het enkele weken voordat u het effect merkt.
- Rituximab wordt meestal gecombineerd met methotrexaat, prednison of een ander anti-reumaticum.
-

Controle

- Tijdens het infuus wordt uw bloeddruk, pols, hartslag en temperatuur regelmatig gecontroleerd.
- Meestal is er ook een bloedcontrole.
- U kunt de uitslagen van het bloedonderzoek opvragen bij uw arts.

Bijwerkingen van rituximab

- Ongewenste reacties of bijwerkingen gebeuren meestal tijdens het inlopen van het infuus.
- Mogelijke bijwerkingen/reacties tijdens het infuus zijn: jeuk, kortademigheid, koorts, rillingen, huiduitslag en/of bloeddrukschommelingen.
- Om de kans op bijwerkingen te verkleinen, worden vóór elk infuus, een anti-allergiemiddel, prednison en paracetamol toegediend.

Mocht u toch bijwerkingen ervaren, dan kan de toediening van rituximab vertraagd of onderbroken worden.

- Patiënten die rituximab gebruiken, hebben een iets grotere kans op infecties. Neem daarom altijd uw temperatuur wanneer u zich ziek voelt. Neem bij koorts of andere tekenen van infectie, bijvoorbeeld een etterend wondje, altijd contact op met uw reumatoloog.

Belangrijk

Een zeldzame maar ernstige bijwerking van rituximab is het optreden van een herseninfectie.

Mocht u last hebben van één of meerdere van de volgende symptomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts:

- Geheugenverlies
- Moeite met nadenken
- Moeite met lopen
- Vermindering/verlies van gezichtsvermogen

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

- Over het gebruik van rituximab tijdens zwangerschap Bestaan er onvoldoende gegevens.
- Overweegt u een zwangerschap of wilt u borstvoeding geven, overleg dan eerst met uw reumatoloog.

Vanwege de lange werkingsduur van rituximab geldt dit advies tot 12 maanden na uw laatste behandeling met rituximab.

Vaccinaties

- De vaccinatie moet minstens 4 weken voor de eerste behandeling met rituximab plaatsvinden.
- De griepvaccinatie (grieprik) is mogelijk voor elke behandeling met rituximab.
- We adviseren om overige vaccinaties eerst met uw huisarts of reumatoloog te overleggen.

Operaties en andere ingrepen

Theoretisch gezien kan rituximab een verhoogd risico op postoperatieve infecties en een vertraagde wondgenezing met zich meebrengen. Daarom raden wij u aan om eventuele operaties uit te stellen tot drie maanden na de laatste toediening van rituximab. De volgende toediening kan pas beginnen nadat de wond genezen is.

Gebruik van medicatie tijdens behandeling met rituximab

Vertel uw huisarts, uw tandarts en uw specialist altijd welke medicijnen u gebruikt. Denk ook aan voedingssupplementen en geneesmiddelen die zonder voorschrift verkrijgbaar zijn.

- Het gelijktijdig gebruik van verschillende medicijnen is niet altijd veilig.
- Licht uw arts in over uw behandeling met rituximab en zeg wanneer u het laatste infuus heeft gehad.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen of opmerkingen, neem dan contact op met uw huisarts of uw reumatoloog.

Onafhankelijke informatie over geneesmiddelen kunt u vinden op de website van het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische informatie www.bcfi.be .