

Secukinumab (Cosentyx®)

Werking van Secukinumab

Secukinumab is een antilichaam dat het eiwit interleukine 17 blokkeert. IL17 speelt een belangrijke rol bij ontstekingen. Bij een aantal reumatische aandoeningen is er sprake van een teveel aan IL17. Secukinumab blokkeert IL17 waardoor ontstekingsklachten verminderen.

Secukinumab kan de pijn en de zwelling in uw gewrichten doen afnemen waardoor uw gewrichten minder schade oplopen.

Wanneer wordt Secukinumab voorgeschreven?

Secukinumab kan voorgeschreven worden aan mensen met een reumatische aandoening (zoals artritis psoriatica en de ziekte van Bechterew) die onvoldoende reageren op andere geneesmiddelen zoals methotrexaat, aTNF en ontstekingsremmers.

Voorafgaand aan de behandeling met Secukinumab dient onderzocht te worden of u in aanmerking komt voor de behandeling en of de behandeling voor u veilig is. Dit houdt o.a. in dat u gescreend wordt op een doorgemaakte TBC infectie in het verleden.

Daarnaast werk Secukinumab niet op darmklachten bij actieve ziekte van Crohn of Colitis ulcerosa.

Het gebruik van Secukinumab

- Het gebruik van Secukinumab gebeurt door onderhuidse injecties. U start met 5 wekelijkse injecties van 150mg of 300mg (dubbele injectie van 150mg) , waarna u maandelijks 1 of dubbele injectie injecteert als onderhoudsbehandeling.
- Secukinumab wordt vaak gecombineerd met methotrexaat (MTX, zie de betreffende informatiefolder).
- Uw arts beoordeelt het effect van de behandeling met Secukinumab na ongeveer 3 tot 6 maanden.

Controle

Tijdens de behandeling met Secukinumab zal uw bloed regelmatig worden afgenomen. Bij deze controle worden rode en witte bloedlichaampjes, bloedplaatjes, leverfuncties en uw nierfunctie beoordeeld. U kunt de uitslagen van het bloedonderzoek opvragen bij uw huisarts.

Bijwerkingen van Secukinumab

De volgende opsomming is niet volledig maar omvat de meest voorkomende bijwerkingen.

- Op de plaats waar u zichzelf injecteert, kan een lichte roodheid of een kleine blauwe plek ontstaan. Als u zich afvraagt of u de juiste injectietechniek toepast, neem dan contact op met uw arts of de thuisverpleegkundig
- Mensen die Secukinumab gebruiken, hebben een grotere kans op infecties, zowel bacteriële infecties als schimmelinfecties. Neem daarom altijd de temperatuur op wanneer u zich ziek voelt. Neem bij koorts of andere tekenen van infectie, bijvoorbeeld een etterend wondje of een verkoudheid, altijd contact op met uw reumatoloog of huisarts en staak de therapie tot u zich beter voelt.

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Over het gebruik van Secukinumab tijdens zwangerschap zijn onvoldoende gegevens bekend. Overweegt u een zwangerschap of wilt u borstvoeding geven, overleg dan eerst met uw reumatoloog.

Vaccinaties

- De griepvaccinatie (grieprik) is mogelijk.
- We adviseren om overige vaccinaties eerst met uw huisarts of reumatoloog te overleggen.

Operaties en andere ingrepen

Op theoretische gronden bestaat er bij het gebruik van Secukinumab een verhoogd risico op postoperatieve infecties en een vertraagde wondgenezing. Daarom wordt over het algemeen geadviseerd Secukinumab tijdelijk te stoppen als u geopereerd moet worden. Het algemeen advies is om twee weken voor een geplande operatie (of andere ingreep) te stoppen met het gebruik van Secukinumab en weer te starten als de wond genezen is.

Gebruik van Secukinumab samen met andere medicijnen

- Vertel uw huisarts, uw tandarts en uw specialist altijd welke medicijnen u gebruikt. Denk ook aan voedingssupplementen en geneesmiddelen die zonder voorschrift verkrijgbaar zijn het gelijktijdig gebruik van verschillende geneesmiddelen is niet altijd veilig.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen of opmerkingen, neem dan contact op met uw huisarts of uw reumatoloog.

Onafhankelijke informatie over geneesmiddelen kunt u vinden op de website van het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische informatie www.bcfi.be .