

Tocilizumab (Roactemra[®])

Werking van tocilizumab

Tocilizumab is een zogenaamde 'biological', een medicijn dat ontwikkeld is dankzij moderne technologie.

Tocilizumab is gericht tegen interleukine-6 (IL-6). Interleukine-6 is een eiwit een belangrijke rol speelt bij ontstekingen. Bij een aantal reumatische aandoeningen is er een teveel aan IL-6. Tocilizumab blokkeert IL-6 waardoor ontstekingsklachten afnemen.

Tocilizumab kan de pijn en zwelling in uw gewrichten verminderen waardoor uw gewrichten op lange termijn minder schade oplopen.

Wanneer wordt tocilizumab voorgeschreven?

Tocilizumab wordt (meestal in combinatie met methotrexaat) gebruikt voor de behandeling van actieve reumatoïde artritis. Tocilizumab kan voorgeschreven worden aan mensen die onvoldoende reageren op andere geneesmiddelen tegen reumatoïde artritis.

Voor de behandeling met tocilizumab moet onderzocht te worden of u in aanmerking komt voor de behandeling en of de behandeling voor u veilig is. Dit betekent dat u gescreend wordt op een vroegere TBC infectie.

Het gebruik van tocilizumab

- Het gebruik van tocilizumab gebeurt door middel van onderhuidse injecties. U leert om uzelf te injecteren (met een zogenaamde prikpen). Dat moet één keer per week gebeuren.
- Tocilizumab werkt snel, soms al na twee weken. Het duurt wel enkele weken voordat er resultaat is.
- Als u goed op het middel reageert of als u bijwerkingen ondervindt, dan kan de periode tussen de injecties verlengd worden.
- Tocilizumab wordt vaak gecombineerd met methotrexaat (MTX, zie de betreffende informatiefolder).

Controle

- Tijdens de behandeling met tocilizumab wordt u bloed regelmatig gecontroleerd op bloedlichaampjes, de leverfunctie, de nierfunctie en het cholesterolgehalte.
- U kunt de uitslagen van het bloedonderzoek opvragen bij uw arts.

Bijwerkingen van tocilizumab

- Op de plaats waar u zichzelf injecteert, kan een lichte roodheid of een kleine blauwe plek ontstaan. Wij adviseren u om de injectieplaats af te wisselen. Als u zich afvraagt of u de juiste injectietechniek toepast, neem dan contact op met uw arts.
- Mensen die met tocilizumab behandeld worden, hebben een iets grotere kans op infecties. Meet daarom altijd uw temperatuur wanneer u zich ziek voelt. Neem bij koorts of andere tekenen van infectie, bijvoorbeeld een etterend wondje, altijd contact op met uw reumatoloog.
- Tocilizumab kan het cholesterol in bloed doen stijgen. Uw huisarts zal het cholesterolgehalte controleren en zonodig cholesterolverlagers voorschrijven.

Zwangerschap en borstvoeding

- Over het gebruik van tocilizumab tijdens zwangerschap zijn onvoldoende gegevens bekend.
- Overweegt u een zwangerschap of wilt u borstvoeding geven, overleg dan eerst met uw reumatoloog.

Vaccinaties

- De griepvaccinatie (griep prik) is mogelijk. Pneumococcon vaccin wordt aangeraden.
- We adviseren om overige vaccinaties eerst met uw huisarts of reumatoloog te overleggen.

Operaties en andere ingrepen

Op theoretische gronden bestaat er bij het gebruik van tocilizumab een verhoogd risico op postoperatieve infecties en een vertraagde wondgenezing. Daarom wordt over het algemeen geadviseerd rondom een geplande (grote) operatieve ingreep, bijvoorbeeld een buikoperatie, te stoppen met tocilizumab voor een periode van circa 40 dagen. Overleg met uw reumatoloog als u geopereerd gaat worden.

Theoretisch gezien kan tocilizumab een verhoogd risico op postoperatieve infecties en een vertraagde wondgenezing met zich meebrengen. Daarom raden wij u aan om eventuele operaties uit te stellen tot 14 dagen na de laatste toediening van tocilizumab. De volgende toediening kan pas beginnen nadat de wond genezen is.

Gebruik van tocilizumab samen met andere medicijnen

- Licht uw arts in over uw behandeling met tocilizumab.
- Het gelijktijdig gebruik van verschillende medicijnen is niet altijd veilig.

Vertel uw huisarts, uw tandarts en uw specialist daarom altijd welke medicijnen u gebruikt. Denk ook aan voedingssupplementen en geneesmiddelen die zonder voorschrift verkrijgbaar zijn.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen of opmerkingen, neem dan contact op met uw huisarts of uw reumatoloog.

Onafhankelijke informatie over geneesmiddelen kunt u vinden op de website van het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische informatie www.bcfi.be .