

## **Uztekinumab (STELARA®)**

### **Werking van Uztekinumab**

Uztekinumab is een antilichaam dat het eiwit IL12 en IL23 blokkeert. IL12 en IL13 spelen een belangrijke rol bij ontstekingen. Bij een aantal reumatische aandoeningen is er sprake van een teveel aan IL12 en IL13. Uztekinumab blokkeert deze eiwitten waardoor ontstekingsklachten verminderen.

Uztekinumab kan de pijn en de zwelling in uw gewrichten doen afnemen waardoor uw gewrichten minder schade oplopen.

### **Wanneer wordt Uztekinumab voorgeschreven?**

Uztekinumab kan voorgeschreven worden aan mensen met een reumatische aandoening (zoals artritis psoriatica en de ziekte van Bechterew) die onvoldoende reageren op andere geneesmiddelen.

Voorafgaand aan de behandeling met Uztekinumab dient onderzocht te worden of u in aanmerking komt voor de behandeling en of de behandeling voor u veilig is. Dit houdt o.a. in dat u gescreend wordt op een doorgemaakte TBC infectie in het verleden.

We gaan eerst nu of u in aanmerking komt voor de behandeling en of de behandeling met Uztekinumab veilig is voor u. U wordt onder meer gescreend op een tuberculose (TBC-) infectie in het verleden.

### **Het gebruik van Uztekinumab**

- Het gebruik van Uztekinumab gebeurt door onderhuidse injecties. Dat moet één keer per DRIE maanden gebeuren.
- Uztekinumab wordt vaak gecombineerd met methotrexaat (MTX, zie de betreffende informatiefolder).
- Uw arts beoordeelt het effect van de behandeling met Uztekinumab na ongeveer 3 tot 6 maanden.

### **Controle**

Tijdens de behandeling met Uztekinumab zal uw bloed regelmatig worden afgenomen. Bij deze controle worden rode en witte bloedlichaampjes, bloedplaatjes, leverfuncties en uw nierfunctie beoordeeld. U kunt de uitslagen van het bloedonderzoek opvragen bij uw arts.

## **Bijwerkingen van Uztekinumab**

De volgende opsomming is niet volledig maar omvat de meest voorkomende bijwerkingen.

- Op de plaats waar u zichzelf injecteert, kan een lichte roodheid of een kleine blauwe plek ontstaan. Als u zich afvraagt of u de juiste injectietechniek toepast, neem dan contact op met uw arts of de thuisverpleegkundig
- Mensen die Uztekinumab gebruiken, hebben een grotere kans op infecties. Neem daarom altijd de temperatuur op wanneer u zich ziek voelt. Neem bij koorts of andere tekenen van infectie, bijvoorbeeld een etterend wondje of een verkoudheid, altijd contact op met uw reumatoloog of huisarts.

## **Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding**

Over het gebruik van Uztekinumab tijdens zwangerschap zijn onvoldoende gegevens bekend. Overweegt u een zwangerschap of wilt u borstvoeding geven, overleg dan eerst met uw reumatoloog.

## **Vaccinaties**

- De griepvaccinatie (grieprik) is mogelijk.
- We adviseren om overige vaccinaties eerst met uw huisarts of reumatoloog te overleggen.

## **Operaties en andere ingrepen**

Op theoretische gronden bestaat er bij het gebruik van Uztekinumab een verhoogd risico op postoperatieve infecties en een vertraagde wondgenezing. Daarom wordt over het algemeen geadviseerd Uztekinumab tijdelijk te stoppen als u geopereerd moet worden. Het algemeen advies is om twee weken voor een geplande operatie (of andere ingreep) te stoppen met het gebruik van Uztekinumab en weer te starten als de wond genezen is.

## **Gebruik van Uztekinumab samen met andere medicijnen**

- Vertel uw huisarts, uw tandarts en uw specialist altijd welke medicijnen u gebruikt. Denk ook aan voedingssupplementen en geneesmiddelen die zonder voorschrift verkrijgbaar zijn het gelijktijdig gebruik van verschillende geneesmiddelen is niet altijd veilig.

**Meer informatie**

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen of opmerkingen, neem dan contact op met uw huisarts of uw reumatoloog.

Onafhankelijke informatie over geneesmiddelen kunt u vinden op de website van het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische informatie [www.bcfi.be](http://www.bcfi.be) .